

Grandes
Cultures

Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 6 du 20/06/95
Sup.n°1**BLE****Maladies : Fin de risque.****Pucerons : A surveiller.****TOURNESOL****Pucerons : Fin de risque.****Mildiou : Nous contacter en cas de nanisme.****MAIS****Pyrale : Début du vol.****BLE**

Stades (Fin floraison : 10-5-3.
)
(Amande aqueuse : 10-5-4.

MALADIES★ **Situation**

Progression lente mais constante de la Septoriose et de la Rouille brune.

★ **Préconisation**

Aucune intervention fongicide ne se justifie maintenant.

PUCERONS DES EPIS★ **Situation**

Pas d'évolution sérieuse des populations qui sont toujours inférieures au seuil d'intervention.

★ **Préconisation**

Surveiller vos parcelles jusqu'au stade grain-laiteux (11-1).

SEUIL : 1 épi sur 2 colonisés.

TOURNESOL

Stade : Boutons étoilés - E1.

PUCERONS

★ Situation

Régression des infestations du fait d'auxiliaires nombreux.

★ Préconisation

Dès le stade E1, toute intervention devient inutile.

MILDIU

★ Situation

Localement des symptômes sont observés en culture notamment dans l'Allier dans les secteurs habituels (BESSON, BOUCE, ST-GERAND-LE-PUY).

IMPORTANT : Jusqu'au stade début floraison, nous signaler toute attaque (notamment nanisme) afin de réaliser des prélèvements pour des analyses d'identification des races de mildiou.

MAIS

Stades : 5 à 8/10 feuilles.

PYRALE

★ Situation

- En cage d'élevage à MARMILHAT (63) : un papillon mâle observé le 16 Juin.
- Piégeage sexuel : Premières captures le 19 Juin à VERTAIZON (63) et la FERTE HAUTERIVE (03).


★ Préconisation

Un prochain bulletin fera le point pour vous indiquer la période optimale d'intervention qui s'annonce déjà moins précoce que l'an dernier.

La carte de l'Auvergne vous précise les secteurs où une lutte anti-pyrale est nécessaire. La dernière campagne doit vous inciter à une très grande vigilance. Les infestations larvaires sont en effet bien plus importantes dans tous les secteurs hachurés (multipliées par 2 dans l'ensemble).

La fiche couleur "Pyrale du Maïs" est à conserver.

PYRALE DU MAÏS




Papillon mâle (entre 1,5 et 2 cm de long) se prend dans les pièges sexuels




Papillon femelle, apparaît de 2 à 8 jours plus tard

PONTES



a - Ponte jeune (oöplaque) 0,5 à 1 cm de long



b - Ponte plus âgée




c - Stade tête noire précédant l'éclosion

CHENILLES



Chenilles (2 à 3 cm de long) au milieu des sciures provenant de leur perforation

DÉGÂTS



Perforation d'une tige occasionnant...



Souvent une casse de la panicule mâle



Parfois une casse de la tige



Chenille dans un épi

SRPV AUVERGNE - PYRALE DU MAIS - BILAN AUTOMNE 1994

OU FAUDRA-T-IL TRAITER EN 1995 ?

